



COVID-19: panoramica delle tipologie di test

	Test PCR nasofaringeo o salivare	Test PCR salivare (campioni aggregati)	Test antigenico rapido nasofaringeo	Test antigenico rapido nasale	Test fai da te nasale
<i>Svolgimento dell'analisi</i>	Laboratorio	Laboratorio	Sul posto (p. es. in farmacia)	Sul posto (p. es. in farmacia)	Ovunque
<i>Prelievo di campioni</i>	Specialista	Chiunque	Persone appositamente formate	Persone appositamente formate	Chiunque
<i>Disponibilità di test validati</i>	Sì	Sì	Sì	Sì (finora 1 test validato)	No
<i>Affidabilità</i>	Molto elevata	Elevata	Elevata	Buona in caso di sintomi; probabilmente più bassa in assenza di sintomi	Buona in caso di sintomi; probabilmente più bassa in assenza di sintomi
<i>Indicazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Persone con sintomi – Persone a rischio – Professionisti della salute – Persone risultate positive al test rapido o al test fai da te 	Test a ripetizione, p. es.: <ul style="list-style-type: none"> – nelle imprese – nelle scuole – del personale delle case per anziani – nelle società sportive 	<ul style="list-style-type: none"> – Persone con sintomi – Test a ripetizione – In caso di contatto con persone particolarmente a rischio (p. es. visita in una casa per anziani) – Test a richiesta, in farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> – Test a richiesta, in farmacia – Test a ripetizione se sul mercato sono disponibili test sufficientemente affidabili 	<ul style="list-style-type: none"> – Test a richiesta, a casa – Test a ripetizione se sul mercato sono disponibili test sufficientemente affidabili
<i>Procedura in caso di test positivo</i>	Isolamento	Test PCR di conferma; isolamento	Test PCR di conferma solo per persone asintomatiche e senza contatto con una persona testata positiva; isolamento	Test PCR di conferma; isolamento	Test PCR di conferma; isolamento